

	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Allegato 4 AZI067
	Meyer	Data 10/03/2020

Dispositivi individuali (DPI) prescritti per l'uso nell'ambito della malattia da coronavirus

Adattato da WHO's novel coronavirus (COVID -19) <https://www.who.int>

AREA	DESTINATARIO	ATTIVITA'	PRESIDI/DPI o PROCEDURA
Locali adibiti al ricovero			
Stanze di degenza	Operatori sanitari	Cura dei pazienti sospetti o con COVID -19	Mascherina chirurgica Camice protettivo TNT monouso Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
	Operatori sanitari	Procedure che possono generare aerosol eseguite su pazienti sospetti o con COVID -19 (es. Tampone – esplorazione faringe)	Maschera filtrante FFP2 standard o FFP3 Camice protettivo rinforzato DPI III categoria Guanti (vinile/ nitrile) Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
	Addetti alle pulizie	Ingresso nella stanza di pazienti sospetti o con COVID -19	Mascherina chirurgica Camice protettivo TNT monouso Guanti (vinile o nitrile) Protezione oculare (se rischio di schizzi di materiale organico o chimico)
	Paziente e genitore (deve rimanere nella stanza)	Ingresso nella stanza di paziente con COVID – 19	Maschera chirurgica quando entra il personale
Altre aree di transito del paziente (corridoi, luoghi di passaggio)	Tutti	Qualsiasi attività che non prevede contatto con pazienti affetti da COVID – 19	Non sono richiesti DPI

Pronto soccorso			
Pretriage	Operatori	Filtro pazienti	Mascherina chirurgica Camice TNT monouso guanti occhiali/visiera
Pretriage	Pazienti con sintomatologia respiratoria	Qualsiasi	Far indossare mascherina chirurgica a paziente e accompagnatore
Triage respiratori	Operatori	Screening preliminare senza contatto diretto	Mantenere una distanza di 1 metro- Oppure dietro al vetro del banco triage (se presente) Non sono richiesti DPI
Triage respiratori	Operatori	Contatto diretto	Mascherina chirurgica Guanti
Triage Non respiratori	Operatori	Qualsiasi	Non sono richiesti DPI
PS	Operatori sanitari	Procedure che possono generare aerosol (es. Tampone esplorazione faringea)	Maschera filtrante FFP2 standard (o FFP3) Camice protettivo rinforzato DPI III categoria Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
PS	Operatori sanitari	Nel caso di paziente sospetto per ulteriori necessità e senza procedure che possono generare aerosol	Mascherina chirurgica Camice TNT monouso Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
Aree Trasversali			
Laboratorio	Tecnici laboratorio	Manipolazione di campioni di materiale delle vie respiratorie	DA TRATTARE SOTTO CAPPA Camice protettivo rinforzato DPI III categoria Guanti Schermo protettivo facciale (visiera)

Radiologia	Tecnico radiologia e altri operatori sanitari	pazienti sospetti o con COVID -19	Mascherina chirurgica Camice protettivo TNT Guanti Protezione oculare (occhiali o schermo facciale)
Comparto Operatorio	Operatori	Pazienti con COVID – 19	Si segue la procedura per pazienti con TBC
Locali non adibiti a ricovero			
Ambulatorio	Operatori sanitari	Visita paziente con sintomatologia respiratoria (non differibile)	Mascherina chirurgica
Ambulatorio	Paziente con sintomatologia respiratoria	Qualsiasi	Mascherina chirurgica
Sala di attesa	Pazienti con sintomatologia respiratoria	Qualsiasi	Mascherina chirurgica Separare o assicurare distanza di almeno un metro
Aree amministrative	Tutti anche sanitari	Attività non assistenziali	Non sono richiesti DPI

Raccomandazioni

Limitare il più possibile il numero di operatori sanitari che entrano nella stanza di pazienti COVID-19. IL tampone deve essere eseguito da un solo operatore sanitario. E' necessario organizzare le attività di cura per ridurre al minimo le entrate nella stanza pianificando in anticipo quali attività saranno eseguite al letto per evitare di continuare a entrare e uscire dalla stanza del paziente.

Assicurarsi che l'uso dei DPI sia razionalizzato e appropriato è indispensabile, in quanto L'uso eccessivo ha un impatto sulla difficoltà attuale di approvvigionamento.